

JÄLKITUTKIMUKSEEN KUTSUMISEN EHDOT

Perustutkimuksen tulosten perusteella voidaan tutkittu kutsua löydöksen tarkistamiseksi jälkitutkimukseen perustutkimuksen aikana (kliiniset tapaukset) tai varsinaiseen jälkitutkimukseen, joka on 2-4 kk:n kuluttua perustutkimuksesta. Yleisperiaate on, että kaikki löydökset, välitöntä hoitoa vaativia lukuunottamatta, kontrolloidaan ennen potilaiden jatkotutkimuksiin/hoitoon ohjaamista.

Jälkitutkimukseen kutsu tapahtuu automaattisesti, paitsi EKG- ja röntgenlöydösten osalta, joiden takia jälkitutkimukseen kutsutaan vain lääkärin harkinnan mukaan.

Jälkitutkimukseen kutsumisen ehdot ja jälkitutkimuksessa tehtävät toimenpiteet ovat seuraavassa taulukossa.

LÖYDÖS	EHTO	TOIMENPITEET JÄLKITUTKIMUKSESSA
Kolesteroli	S-Kol > 400 mg/100 ml S-Kol ≥ 350 ja ikä ≤ 45 v	Koronaarihaastattelu EKG
Kolesteroli- verrokki	Ikä-sukupuolimach.pari, S-Kol ≤ 400 niille, joilla S-Kol > 400 mg/100 ml	S-Kol ja S-Trigl Thorax-rtg, iso kuva
Triglyseridi	S-Trigl > 275 mg/100 ml ja ikä < 65 v	kliininen tutkimus,
Triglyseridi- verrokki	Ikä-sukupuolimach; S-Trigl ≤ 275, pari niille, joilla S-Trigl > 275	sydänlomake
Verenpaine	≥ 180 ja/tai ≥ 100, tai ≥ 160 ja/ tai ≥ 95 ja ikä < 45, tai diast < 20	3 verenpainemittaus- ta, jos edelleen kor- kea niin EKG, thorax- rtg ja kliininen tutk., sydänlomake
EKG	Lääkärin harkinnan mukaan	Koronaarihaastattelu EKG, thorax-rtg ja kliininen tutkimus, sydänlomake

LÖYDÖS	EHTO	TOIMENPITEET JÄLKITUTKIMUKSESSA
Koronaari- haastattelu	Luokat: - lepoheingenaahdistus - vaikea rasitusheingenaahdistus - mahd. anamn. infarkti ja tyypillinen angina pectoris - mahd. anamnestinen infarkti - tyypillinen angina pectoris - vaikea tyypillinen klaudikaatio - lievä tyypillinen klaudikaatio	Koronaarihaastattel EKG Thorax-röntgen Kliininen tutkimus, sydänlomake
Thorax-rtg, sydänlöydös	Lääkärin harkinnan mukaan	Thorax-rtg, iso kuva EKG, kliininen tutk. sydänlomake
Thorax-rtg, muu löydös	Lääkärin harkinnan mukaan	Thorax-rtg, iso kuva kliininen tutkimus, röntgenlomake
Glukoosi	Paasto P-Gluk ≥ 110 mg/100 ml, tai Rasitus P-Gluk ≥ 200 , tai Clinistix: +	Glukoosirasitus U-Gluk.
Hkr	B-Hkr ≤ 35 tai > 55	B-Hb, B-Hkr, B-Er, B-Leuk, diffi, B-La, S-Fe, S-TIBC kliininen tutkimus, hemat. lomake
Tyroksiini	S-Tyroksiini ≤ 3.0 μ g T4-J/100 ml S-Tyroksiini ≥ 8.0 μ g T4-J/100 ml	S-Tyroksiini, S-T3 kliininen tutkimus, kilpirauhaslomake
Virtsa	Uricult $\geq 10^4$ Albustix: + ja keittokoe: + Hemastix: +	Uricult, tyyppaus, herkkyysmääritys, Albustix, Hemastix, sedimentti; kliininen tutk., munuaislomake
Kreatiniini	S-Kreat > 1.40 mg/100 ml	S-Kreat ja kuten edellinen
Toisto- populaatio	Joka 10:s, ikä 35-64 v	Kaikki perustutki- mustoimenpiteet, paitsi thorax-rtg
Puuttuva tieto	Perustutkimuksen tärkeä tieto puuttuu	Puuttuvan tiedon mittaus