

Liitetaulukko 2. Sairausryhmittäiset painokertoimet sairastavuuden yleisindeksissä.

Sairausryhmät	Kuolleisuus		Työkyvyttömyys		Terveyteen liittyvän elämänlaadun vaje		Terveydenhuollon suorat kustannukset		Yhteensä
Sairausryhmä	Osuus kaikista menetetyistä elinvuosista (%)	Paino indeksissä	Osuus kaikista työkyvyttömyys-eläkkeistä (%)	Paino indeksissä	Osuus sairauksien aiheuttamasta elämänlaadun vajeesta ² (%)	Paino indeksissä	Osuus kaikista terveydenhuollon kustannuksista (%)	Paino indeksissä	Paino yhteensä³
Syövät	26,0	10,3	1,9	0,6	2,2	0,9	6	2,8	14,6
Sepelvaltimotauti	12,7	5,0	1,7	0,5	6,6	2,6	7,9	3,7	11,9
Aivoverisuonien taudit	4,4	1,7	3,1	1,0	2,6	1,0	9,1	4,3	8,0
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet	0	0,0	24,1	7,5	20,6	8,2	11	5,2	20,8
Mielenterveys	8,3	3,3	45,1	14,0	19,1	7,6	6,4	3,0	27,8
Tapaturmat	10,8	4,3	4,8	1,5	5,9	2,3	6	2,8	10,9
Dementia	1,1	0,5	0,1	0,0	5,9	2,3	6,6	3,1	5,9
Kattavuus¹ ilmiöalueen sisällä	63,2	-	80,8	-	62,9	-	53,0	-	-
Paino indeksissä (%)	-	25,0	-	25,0	-	25,0	-	25,0	100

¹ Kaikkien tarkasteltujen sairausryhmien yhteenlaskettu osuus kyseisestä ilmiöstä (esim. menetetyistä elinvuosista ikävälillä 0–80 vuotta).

² Sairastavuusindeksiin sisällytetyn sairausryhmän osuus kaikkien keskeisten elämänlaadun vajetta aiheuttavien kroonisten sairauksien aiheuttamasta elämänlaadun vajeesta Saarin ym. (2006) mukaan.

³ Sairausryhmän paino yleisindeksissä saadaan laskemalla yhteen sen näkökulmakohtaiset painot, jotka saadaan kaavalla $0,25 * (\text{yksittäisen sairausryhmän kattama osuus kyseisestä ilmiöstä (esim. menetetyistä elinvuosista)} / \text{kaikkien tarkasteltujen seitsemän sairausryhmien yhdessä kattama osuus ko. ilmiöstä})$.

Painokertoimien tuottamisessa käytettyjä lähteitä:

1) Sairausryhmittäiset kuolleisuusosuudet ennenaikaisesti menetetyistä elinvuosista (PYLL) on laskettu seuraavien lähteiden pohjalta:

- kuolleisuusaineisto: SVT: Kuolemansyyt. Kuolleet peruskuolemansyyin ja iän mukaan. Tilastokeskus.
- PYLLin laskentakaava: Vohlonen I, Bäckmand H, Korhonen J. "Menetetyt elinvuodet PYLL-indeksi väestön hyvinvoinnin mittana". Suomen Lääkärilehti 2007;62(4)305-309.

2) Työkyvyttömyys, laskennassa käytetyt lähteet:

- SVT: Kelan tilastollinen vuosikirja 2010.
- SVT: Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2010. ETK / Kela 2011.

3) Terveyteen liittyvän elämänlaadun vaje, laskennassa käytetyt lähteet:

- Saarni SI, Härkänen T, Sintonen H, Suvisaari J, Koskinen S, Aromaa A, Lönnqvist J.: The impact of 29 chronic conditions on health-related quality of life: a general population survey in Finland using 15D and EQ-5D. Qual Life Res. 2006 Oct;15(8):1403-14.
- WHO: Burden of Disease Statistics.

4) Terveydenhuollon suorat kustannukset, laskennassa käytetyt lähteet:

- Kiiskinen, Teperi, Häkkinen, Aromaa: Kansantautien ja toimintakyvyn vajavuuksien yhteiskunnalliset kustannukset. Kirjassa: Aromaa, Huttunen, Koskinen, Teperi: Suomalaisten terveys, Helsinki 2005.
- SVT: Somaattinen erikoissairaanhoido 2010. THL 2011.