

15.1.2021

## Anvisning för användning av diagnoskoder för dokumentation av covid-19-virusinfektion

Den här anvisningen ersätter de anvisningar för dokumentation av covid-19-diagnoser som meddelats hälso- och sjukvården den 27 februari 2020 och den 30 mars 2020 samt munhälsovården den 2 april 2020.

Den förnyade anvisningen för dokumentation av diagnoser motsvarar nuvarande testpraxis och testmetoder. I uppdateringen av anvisningarna har diagnoskoderna U08.9, U09.9 och U10.9, vilka togs i bruk i december 2020, lagts till.

Diagnosinformationen används för att följa epidemiläget och därför är det ytterst viktigt att använda korrekta diagnoskoder. Om koderna inte finns i det datasystem som används, ska den egna verksamhetsenhetens IT-förvaltning kontaktas.

### Anvisningarna om diagnoskoder och dokumentation har grupperats enligt följande:

- Tabell för val av rätt diagnos
- Akut covid-19-virusinfektion
- Exponering och uteslutande av covid-19-virusinfektion
- Följdtillstånd efter covid-19-virusinfektion
- Motsvarigheter mellan ICD-10-diagnoser och ICPC-2-besöksorsaker
- Covid-19-virusinfektion inom munhälsovården

Vi ber er distribuera anvisningen till den hälso- och sjukvårdspersonal som gör journalanteckningar.

### Tabell för val av rätt diagnos

Patientens symtom	Patientens anamnes	Laboratorieresultat	ICD-10-diagnos
Symtomen passar för covid-19-infektion		PCR + eller antigen test +	U07.1
		PCR -, antigen test -, antikropp +	U07.2
		PCR -, antigen test -, antikropp -	Annan lämplig diagnos eller U07.2 *
		Ej undersökt	U07.2
Inga symtom eller symtomen tyder inte på covid-19-infektion	Sannolik exponering	PCR + eller antigen test +	U07.1
		PCR -, antigen test -, antikropp +	R76.0
		PCR -, antigen test -, antikropp - eller laboratorieprov har inte tagits	Z20.8
	Ingen exponering	PCR + eller antigen test +	U07.1
		PCR -, antigen test -, antikropp +	R76.0
		PCR -, antigen test -, antikropp -	Z11.5

\* Diagnos U07.2 kan användas om anamnesen, den kliniska bilden och andra fynd hos en patient med symtom enligt infektionsläkarens bedömning klart tyder på akut covid-19-virusinfektion, även om resultaten från PCR- och antigenundersökningen är negativa.

## Akut covid-19-virusinfektion

1. Vid dokumentation av en covid-19-virusinfektion som **verifierats med nukleinsyrapåvisning (PCR) eller antigenest** ska ICD-10-diagnoskod användas  
**U07.1 COVID-19, virus påvisat**
  - Det rekommenderas att diagnosens säkerhetsgrad dokumenteras som **Sannolik eller säker**.
2. ICD-10-diagnoskoden vid **misstänkt** covid-19-virusinfektion är  
**U07.2 Misstänkt COVID-19-infektion, virus ej påvisat**
  - Diagnosen **U07.2** används om läkaren anser att en covid-19-infektion är sannolik på basis av patientens anamnes och symtombild, men sjukdomsalstraren inte har utretts med PCR- eller antigenundersökning eller svar på dem inte har fått.
  - Diagnosen **U07.2** kan också användas om anamnesen, den kliniska bilden och andra fynd hos en patient med symptom enligt infektionsläkarens bedömning tydligt tyder på akut covid-19-virusinfektion, även om resultatet av PCR- eller antigenundersökningen är negativt.

Om covid-19-prover tas av patienten och **svaren visar att det inte är fråga om** en covid-19-infektion, används därefter annan lämplig diagnoskod.

Under perioder då en patient är intagen på en vårdavdelning inom den specialiserade sjukvården rekommenderas det att som huvuddiagnos använda en diagnos enligt patientens sjukdomsbild för att beskriva infektionens svårighetsgrad och patientens helhetssituation, och som bidiagnos diagnosen U07.1 eller U07.2 för covid-19, t.ex.

- Huvuddiagnos **J12.8 Annan specificerad viruspneumoni**, bidiagnos **U07.1 COVID-19, virus påvisat**
  - Huvuddiagnos **J96.0 Akut respiratorisk insufficiens**, bidiagnos **U07.1 COVID-19, virus påvisat**.
3. Diagnosen som beskriver **inflammatoriska syndrom i flera organsystem** i samband med covid-19-virusinfektion är  
**U10.9 Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med COVID-19, ospecificerad**
    - Diagnosen ställs inom den specialiserade sjukvården. Den innehåller cytokinstorm, ett syndrom som liknar Kawasakis sjukdom och ett inflammatoriskt syndrom i flera organsystem hos barn (PIMS eller MIS-C), vilka har ett tidsmässigt samband med covid-19-virusinfektion.
    - Diagnosen innehåller inte Mukokutant lymfkörtelsyndrom (Kawasaki), vars ICD-10-kod är M30.3.

## Exponering och uteslutande av covid-19-virusinfektion

4. Vid vård av **symptomfria personer** som med säkerhet eller stor sannolikhet har exponerats för covid-19-virusinfektion används ICD-10-koden  
**Z20.8 Kontakt med och exponering för annan smittsam sjukdom.**
5. Om patienten genomgår laboratorieundersökningar i screeningsyfte **för uteslutande av** covid-19-virusinfektion eller i samband med symtom som tyder på annan sjukdom används ICD-10-koden  
**Z11.5 Riktad hälsokontroll avseende andra virussjukdomar eller**
  - Om en PCR- eller antigenundersökning som tagits i screeningsyfte är positiv, används ICD-10-koden **U07.1 COVID-19, virus påvisat.**
  - Om covid-19-antikroppar konstateras i prov som tagits i screeningsyfte från symptomfria patienter, används ICD-10-koden **R76.0 Förhöjd antikroppstiter.**

## Följdtillstånd efter covid-19-virusinfektion

6. **U08.9 COVID-19 i den egna sjukhistorien, ospecificerad**
  - Koden kan användas för att uttrycka en tidigare insjuknad, verifierad eller sannolik covid-19-virusinfektion som påverkar hälsotillståndet, men personen har inte längre symtom på akut covid-19-virusinfektion.
  - Diagnos U08.9 används för att beskriva en persons hälsotillstånd, men det är inte fråga om en aktuell sjukdom eller skada. Personen har inte längre några symtom, men besöket har samband med tidigare insjuknad covid-19.
  - Koden ska inte användas i dödsattesterna som omedelbar eller underliggande dödsorsak.
7. **U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter COVID-19, ospecificerad**
  - Tilläggs-koden kan användas för att beskriva personens hälsoproblem som har samband med en covid-19-virusinfektion. Koden används inte när en person för närvarande har en akut covid-19-virusinfektion.
  - Diagnosen U09.9 används parallellt med den andra diagnos-koden som **tilläggsdiagnos** då patienten inte längre har symtom på akut covid-19-virusinfektion. En sådan diagnos kan till exempel vara R43.0 Anosmi.

## Motsvarigheter mellan ICD-10-diagnoserna och ICPC 2-besöksorsakerna

ICD-10-diagnos		Besöksorsak enligt ICPC 2-klassificeringen	
U07.1	COVID-19, virus påvisat	R83	Infektion i andningsorganen, annan
U07.2	Misstänkt COVID-19-infektion, virus ej påvisat	R83	Infektion i andningsorganen, annan
Z20.8	Kontakt med och exponering för annan smittsam sjukdom	A23	Risikfaktor, ospecificerad
Z11.5	Riktad hälsokontroll avseende andra virussjukdomar	A33	Generella och ospecifika, Mikrobiologiskt/annat immunologiskt prov
R76.0	Förhöjd antikroppstiter	A91	Avvikande undersökningsfynd, annan
U08.9	COVID-19 i den egna sjukhistorien, ospecificerad		Lämplig kod för besöksorsak används, till exempel symptomkod.
U09.9	Postinfektiöst tillstånd efter COVID-19, ospecificerad		Lämplig kod för besöksorsak används, till exempel symptomkod.
U10.9	Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med COVID-19, ospecificerad		Lämplig kod för besöksorsak används, till exempel symptomkod.

Läkarna ska i första hand använda ICD-10-koder och skötarna ICPC 2-koder.

## Dokumentation av covid-19-virusinfektion inom munhälsovården

Inom munhälsovården besöker en patient med covid-19-virusinfektion mottagningen främst av någon annan orsak än covid-19-virusinfektionen (till exempel på grund av tandinflammation) och därför används koderna oftast som bidiagnos.

Det finns två ICD-10-diagnoskoder för en covid-19-virusinfektion:

***U07.1 COVID-19, virus påvisat och***

***U07.2 Misstänkt COVID-19-infektion, virus ej påvisat.***

Vid behandling av symptomfria personer som med säkerhet eller stor sannolikhet exponerats för covid-19-virusinfektion används ICD-10-koden **Z20.8 Kontakt med och exponering för annan smittsam sjukdom.**

Närmare anvisningar om användningen av dessa diagnoser finns i punkterna 1, 2 och 4 ovan. De andra koderna för covid-19-infektion används enligt de allmänna anvisningarna ovan.

**Mer information:** [sotetiedonhallinta@thl.fi](mailto:sotetiedonhallinta@thl.fi)