


Bild. Utredningsgången vid smittspårning



¹ Smittspårning av annan tuberkulos genomförs om exsudat från infektionshärderna är färgningspositivt och aerosolbildning av exsudat förekommer.

² Smittsamhetstiden bestäms enligt hur länge patienten har luftvägssymtom, om detta är oklart så räknas de föregående tre månaderna som smittsamhetstid.

³ Den behandlande läkaren fastställer smittsamhetstiden.

⁴ Smittsamhetstiden bestäms enligt hur länge patienten har luftvägssymtom, om detta är oklart så räknas den föregående månaden som smittsamhetstid.

⁵ Exponeringsutrymme på cirka 60m² ("klassrum") eller mindre.

⁶ T.ex. återupplivning, intubation, bronkoskopi och obduktion utan lämpliga andningskydd (FFP2/FFP3). Vid färgningsnegativa fall (liten risk för smitta) bedöms behovet av smittspårning från fall till fall.

⁷ Personer under 35 år och personer oberoende av ålder som har en sjukdom eller genomgår en läkemedelsbehandling som ökar risken för att insjukna (se tabell De viktigaste sjukdomarna och läkemedelsbehandlingarna som ökar risken för att insjukna i tuberkulos och bild Genomförande av undersökningar, uppföljning och bedömning och behandling av LTBI hos personer som utsatts för exponering).