

## Bild. Undersökningar av patienter med immunbrist

Bedömning av LTBI, specialiserade sjukvården  
Bakgrundssjukdom som ökar risken för att insjukna eller nedsatt immunsvär

Thx-rtg och status  
normala, inga symtom<sup>1</sup>

Läkemedelsbehandling  
med TNF-blockerare,  
transplantation av ett  
fast organ, obehandlad  
HIV (och CD4 < 0,35)

Stamcellstransplantation,  
HIV-infektion  
(HIV-behandling  
< 6 månader)

Cellgifter, andra  
biologiska läkemedel än  
TNF-blockerare, steroider  
> 20 mg/dag > 1 månad

Stendammlunga, HIV-in-  
fektion (HIV-behandling  
> 6 månader och CD4  
> 0,35), dialysbehandling

Individuell bedömning av  
användning av IGRA-test

IGRA 2 månader efter senaste exponering

LTBI-behandling utifrån  
exponeringsinformation

LTBI-behandling utifrån  
exponeringsinformation  
eller IGRA-resultat<sup>2</sup>

LTBI-behandling utifrån  
exponeringsinformation och  
IGRA-resultat<sup>2</sup>

Uppföljning i samband med poliklinikbesök inom den specialiserade sjukvården, Thx-rtg 6 månader efter avslutad LTBI-behandling

<sup>1</sup> Den exponerade informeras om vilka symtom som tyder på tuberkulos och när personen bör ta kontakt för undersökningar.

<sup>2</sup> Se sida Behandling av latent tuberkulos inom den specialiserade sjukvården.