

Tabell. Biverkningar av LTBI-behandling

**I Vanlig biverkning**

**II Ganska vanlig biverkning**

**III Sällsynt biverkning**

Biverkning	Rifampicin	Isoniazid	Rifapentin
Urin och tårvätska blir röd. Kontaktlinser får inte användas under behandlingen.	I		I
Illamående, kräkningar.	II	II	II
Transaminaser stiger utan symtom.	II	I	II
Läkemedelshepatit.	II	I	II
Överkänslighetsreaktioner (feber och hudsymtom), urtikaria.	I	II	I
Neuropati (domningar, stickningar, känselstörningar), om B6-vitamin inte används.		I	
Hudutslag av aknetyp.		III	
Attacker av rodnad och klåda i ansiktet och/eller skalpen 2–3 timmar efter intag av läkemedlet rifampicin. Kan förebyggas med antihistamin.	III		
Tyramin eller histamin i vissa livsmedel kan orsaka rodnad i ansiktet/huvudvärksattack. I vissa fall kan det leda till att blodtrycket sjunker och att personen svimmar. Detta kan förebyggas genom att undvika följande livsmedel: mogna ostar, tonfisk, salamiliknande korvar, rödvin.		III	
Yrsel.	III	III	III
Depression, psykos.		III	
Huvudvärk, ataxi, koncentrationsstörningar, hallucinationer.	III		
Förändringar i blodbilden (leukopeni, trombopeni).	III	III	III
Ledvärk.		III	III
Akut njursvikt (interstitiell nefrit, tubulär nekros, lupusnefrit).	III	III	

Mer information om biverkningar av läkemedel mot tuberkulos <http://tuberkuloosi.fi/tb-apuri/#/> (på finska). Klicka på "Tietoa lääkemyhdistelmistä" och kryssa för det läkemedel patienten använder. Välj därefter "Haittavaikutukset" under rubriken "Tietoa lääkemyhdistelmistä".