

Bedömning av smittorisen

Exponering	Smittorisk
<p>* Ingen känd kontakt med en patient som omfattas av misstanke om ebolavirusinfektion eller som har en verifierad ebolavirusinfektion.</p>	Mycket liten
<p>* Tillfällig kontakt (t.ex. suttit i samma väntrum eller fordon, handskakning) med en patient Liten risk i god kondition (uppvisar inte kräkningar, diarré, hosta eller blödningar), som omfattas av stark misstanke om ebolavirusinfektion eller som har en verifierad ebolavirusinfektion.</p> <p>* Närbkontakt (t.ex. klinisk undersökning, mätning av feber eller blodtryck av läkare) med en patient i god kondition (uppvisar inte kräkningar, diarré, hosta eller blödningar), som omfattas av stark misstanke om ebolavirusinfektion eller som har en verifierad ebolavirusinfektion.</p> <p>* Obs! Risken bedöms vara liten för personal som har vårdat ebolapatienter och använt lämplig skyddsutrustning.</p>	Liten risk
<p>* Närbkontakt i (<1 m) utan lämplig skyddsutrustning (inkl. skyddsglasögon) med en bolapatient Stor risk som uppvisar kräkningar, diarré, hosta eller blödningar.</p> <p>* Exponering för blod eller sekret från en ebolapatient via nålstick, på huden eller på slemhinnorna.</p> <p>* Deltagande i begravning av och direkt kontakt med en död ebolapatient utan lämplig skyddsutrustning.</p> <p>* Oskyddat sex med en ebolapatient eller en person som tillfrisknat från ebola för mindre än tre månader sedan.</p> <p>* Direkt kontakt med fladdermöss, gnagare, gorillor, apor, vildsvin eller antiloper i ett epidemiområde.</p>	Stor risk