Källa: THL 2019, Anvisningar för difterifall

Bild 1. Åtgärder vid misstanke om difteri.

Misstänk difteri när personen konstateras ha fynd som passar in på luftvägsdifteri eller huddifteri, minst ett annat kriterium som understöder diagnosen uppfylls och ingen annan diagnos förklarar symtombilden (se. Difterimisstanke och differentialdiagnostik).

↓

Iaktta **försiktighetsåtgärder för dropp- och kontaktsmitta**

↓

Konsultera genast

- **under tjänstetid** sjukvårdsdistriktets infektionsläkare
- **under jourtid** infektionsläkaren i det egna sjukvårdsdistriktet eller Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS, tfn 09 4711)

Anmäl även misstanken

- till läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar i patientens boendekommun
- laboratoriet
- under tjänstetid till THL:s smittskyddsläkare, under jourtid meddelar infektionsläkaren i det egna sjukvårdsdistriktet eller HUS jourhavande på THL om misstanken

↓

Ordna **laboratorieprovtagning** så snart som möjligt

↓

Kartlägg preliminärt eventuella **exponerade personer** som har varit i närkontakt med patienten under de **10 dygnen** innan sjukdomen bröt ut

↓

När laboratoriediagnosen säkerställts inleder och koordinerar den läkare som har ansvar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet spårningen av de exponerade, bekämpningsåtgärderna, insamlandet av uppgifter och informationen. THL bistår och tar vid behov ansvaret för koordineringen.