

Förebyggande rabiesvaccinationer av arbetstagare

| Riskklass | Grupp av arbetstagare | Rekommendation |
|--------------|--|---|
| Ständig | <ul style="list-style-type: none">Personer som undersöker rabiesvirus på ett laboratorium.Personer som deltar i framställningen av rabiesvaccin. | <ul style="list-style-type: none">Förebyggande vaccinationsserieAntikroppstest med 6 månaders intervallBoostervaccin när antikropps-nivån är < 0,5 IU/ml |
| Återkommande | <ul style="list-style-type: none">Personer som hanterar, undersöker och vårdar djur¹ samt viltvårdare i länder med endemisk rabies.Personer som hanterar och undersöker fladdermöss. | <ul style="list-style-type: none">Förebyggande vaccinationsserieAntikroppstest med 2 veckors intervallBoostervaccin när antikropps-nivån är < 0,5 IU/ml |
| Tidvis | <ul style="list-style-type: none">Personer som hanterar, undersöker och vårdar djur¹ samt viltvårdare i länder utan endemisk rabies (Finland). | <ul style="list-style-type: none">Förebyggande vaccinationsserieInga antikroppstestInga rutinmässiga boostervaccinationer |

¹ Till exempel veterinärer och veterinärmedicinska studerande, djurskötare