

# Anvisningar till personer som har fått vaccin mot apkoppor

Du har fått Jynneos-vaccinet, som hjälper din kropp att skydda sig mot apkoppsviruset. Tack vare vaccinet kan symtomen som hör till sjukdomen vara lindrigare, eller smittan kan helt förhindras.

Efter vaccinationen kan du vanligtvis fortsätta din vardag på samma sätt som före vaccinationen. Till exempel finns det ingen anledning att undvika att gå till bastun eller undvika normal träning.

Liksom alla läkemedel kan också detta vaccin ha biverkningar. De flesta av symtomen är milda och kortvariga och förekommer bara hos några av dem som har vaccinerats.

## Möjliga symtom

- **Lokala symtom på injektionsstället:** hetta, rodnad, svullnad, smärta, klåda, förhårdnad
- **Allmänna symtom:** huvudvärk, muskelsmärta, feber, frossa, trötthet eller illamående

Övriga biverkningar är mycket sällsynta.

Allmänna och lokala symtom uppträder inom ett par dagar efter vaccination. De försvinner vanligtvis inom några dagar. Även om det lokala symptomet varar längre, indikerar det vanligtvis inte en allergi.

Allmänna och lokala symtom är inte farliga. De hindrar inte ytterligare vaccination, om det behövs.

## Behandling av symtom

Du kan lindra smärta, värk, feber och lokala symtom med febernedsättande- och smärtstillande läkemedel. Antihistamin kan lindra klåda i huden. Ett svalt omslag kan hjälpa mot hetta och svullnad.

## Om symtomen fortsätter

Kontakta hälso- och sjukvården per telefon. Om du har exponerats för apkoppor före vaccination kan symtomen även tyda på en apkoppsinfektion.

Det försvagade viruset i vaccinet kan inte föröka sig i kroppen. Så du kan inte få en apkoppssmitta från vaccinet.

**Vaccinet eliminerar inte helt risken för smitta. Om du får symtom som tyder på apkoppor, kontakta hälso- och sjukvården per telefon.**