Kuva 1. Toimenpiteet difteriaepäilyn herätessä.

Epäile difteriaa, kun henkilöllä todetaan hengitystiedifteriaan tai ihodifteriaan sopivat löydökset, vähintään yksi muu diagnoosia puoltava kriteeri täyttyy ja muu diagnoosi ei selitä oirekuvaa (ks. Difteriapäily ja erotusdiagnostiikka).

↓

Huolehdi **pisara- ja kosketusvarotoimista**

↓

Konsultoi heti

- **virka-aikana** sairaanhoitopiirin infektiolääkäriä
- **päivystysaikana** oman sairaanhoitopiirin tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) infektio-päivystäjää (puh. 09 4711)

Ilmoita epäilystä myös

- potilaan asuinkunnan tartuntataudeista vastaavalle lääkärille
- laboratorioon
- virka-aikana THL:n tartuntatautilääkärille, päivystysaikana oman sairaanhoitopiirin tai HUS:n infektiolääkäri ilmoittaa epäilystä THL:n päivystäjälle

↓

Järjestä **laboratorionäytteiden otto** mahdollisimman pian

↓

Kartoita alustavasti mahdollisia **altistuneita henkilöitä**, jotka ovat olleet lähikontaktissa sairastuneen kanssa taudin puhkeamista edeltävien **10 vuorokauden** aikana

↓

Laboratoriodiagnoosin varmistuessa kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri käynnistää ja koordinoi altistuneiden jäljityksen, torjuntatoimet, tietojen keräämisen ja tiedottamisen. THL avustaa ja ottaa koordinointivastuun tarvittaessa.