Lähde: THL 2019, Toimenpideohje difteriatapauksiin

Kuva 2. Difteriapotilaan hoidon vaiheet.

Valitse hoitopaikka taudinkuvan vakavuuden mukaan ja järjestä näytteiden otto mahdollisimman pian

Vakavasti sairaat hoidetaan **pisara- ja kosketusvarotoimin** sairaalassa, jossa on mahdollisuus antitoksiinin antamiseen ja tehohoitoon

Lieväoireiset ja oireettomat kantajat voidaan hoitaa kotona

Antitoksiinia käytetään niiden henkilöiden hoitoon, joilla on todettu tai on perusteltua epäillä toksiinia tuottavan **corynebakteerikannan aiheuttamaa infektiota**

Antitoksiinihoito tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti. **Ennen antitoksiinihoidon aloitusta** konsultoi mahdollisuuksien mukaan allergologia

- testaa yliherkkyys antitoksiinille (taulukko 1)
- anna tarvittaessa siedätyshoito (taulukko 2)

Anna antitoksiini kerta-annoksena laskimoon tai lihaksensisäisesti

- annos taudinkuvan mukaisesti (taulukko 3)
- anafylaksian hoitovalmiudessa

Aloita mikrobilääkehoito (taulukko 4) **14 vuorokauden ajaksi**, **oireettomille kantajille 7 vuorokauden ajaksi**

Varmista difteriaa aiheuttavan bakteerin häviäminen nielusta, iholta tai muulta infektoituneelta alueelta **kahdella vähintään 24 tunnin välein otetulla viljelynäytteellä**, kun mikrobilääkehoidon lopetuksesta on kulunut vähintään 24 tuntia

Jos bakteeria ei ole saatu hävitettyä, aloita **uusi 10 päivän mittainen antibioottihoitojakso** alueen infektiolääkärin konsultaation jälkeen

Anna toipilasvaiheessa **1 tehosteannos difteriatoksoidia sisältävää rokotetta** kaikille paitsi niille, jotka ovat aiemmin saaneet täyden difteriarokotussarjan ja viimeisimmästä rokotuksesta on alle 12 kuukautta aikaa

- jos potilas ei ole varmuudella saanut aiemmin täyttä perussarjaa, huolehdi suojan täydentämisestä