


Kuva 2. Tuhkarokolle altistuneiden suojaus, seuranta ja karanteeni (terveydenhuollon henkilökunnan osalta ks. ”Terveystuhoon ammattilaisten kohdalla huomioitavaa”)



¹ Jos tuhkarokkoon sairastunut henkilö on saanut Pohjoismaissa 2 rokotetta tuhkarokkoa vastaan, rajataan tartunnanjäljitys rokottamattomiin pikkulapsiin, raskaana oleviin ja immuunipuutteisiin. Suurissa joukkoaltistustilanteissa tuhkarokolle mahdollisesti altistuneiden henkilöiden suojausten tarve arvioidaan tapauskohtaisesti.

² Jos sairastetusta taudista ja annetuista rokotteista on epäselvyyttä, voidaan aikataulun salliessa tutkia vasta-aineet (yhteys oman sairaanhoitopiiriin laboratorioon tai THL:n Asiantuntijamikrobiologiayksikköön puh. 029 524 6116 tai 029 524 8365). Jos vasta-ainetulosten perusteella henkilöllä ei ole suojaa tuhkarokkoa vastaan, annetaan immunoglobuliini.

³ Vaikeasti immuunipuutteisille henkilöille annetaan immunoglobuliini rokotusstatuksesta riippumatta.

⁴ Esimerkiksi suurissa joukkoliikennevälineissä, kuten laivalla tai junassa matkustaneiden tuhkarokkotapausten kohdalla yksittäisen henkilön altistumisen todennäköisyyttä on usein vaikea arvioida. Tällöin tuhkarokolle mahdollisesti altistuneiden, aiemmin suojaamattomien henkilöiden karanteeniin asettamisen tarvetta harkitaan tapauskohtaisesti.