

Tartuntariskin arviointi

Altistus	Tartuntariski
<ul style="list-style-type: none">• ei tiedossa kontaktia potilaaseen, jolla epäillään tai on varmistettu ebolavirusinfektio	erittäin pieni riski
<ul style="list-style-type: none">• satunnainen kontakti (esim. istunut samassa odotushuoneessa tai liikennevälineessä, kättely) hyväkuntoiseen (ei oksenna, yski tai ripuloi eikä verenvuotoja) potilaaseen, jolla on vahva syy epäillä tai on varmistettu ebolavirusinfektio• lähikontakti (esim. lääkärin kliininen tutkimus, kuumeen tai verenpaineen mittausta) hyväkuntoiseen (ei oksenna, yski tai ripuloi eikä verenvuotoja) potilaaseen, jolla on vahva syy epäillä tai on varmistettu ebolavirusinfektio• huom. henkilökunnan, joka on hoitanut ebolapotilaita asianmukaisia suojaimeja käyttäen, riski arvioidaan pieneksi	pieni riski
<ul style="list-style-type: none">• lähikontakti (<1 m) ilman asianmukaista suojautumista (sis. silmien suojaus) ebolapotilaaseen, joka oksentaa, ripuloi, yskii tai jolla on verenvuotoja• neulanpisto-, iho- tai limakalvoaltistus ebolapotilaan verelle tai eritteille• osallistuminen hautajaisiin ja suora kosketus kuolleeseen ebolapotilaaseen ilman asianmukaista suojautumista• suojaamaton seksikontakti ebolapotilaaseen tai ebolasta alle 3 kuukautta aikaisemmin parantuneeseen henkilöön• suora kosketus lepakkoon, jyrsiijään, gorillaan, apinaan, villisikaan tai antilooppiin epidemia-alueella	suuri riski