

**Taulukko 2. Tärkeimmät tuberkuloosiin sairastumisen riskiä lisäävät sairaudet ja lääkitykset.**

| Sairaus/lääkitys  | Hoitoon ohjaamisen kiireellisyys   |
|---|--|
| Silikoosi (kivipölykeuhko)  | Ei-kiireellinen lähete.  |
| Dialyysihoitoa vaativa krooninen munuaisten vajaatoiminta   | Ei-kiireellinen lähete.  |
| Elinsiirto (kiinteän elimen siirto tai kantasolusiirto)   | Kiireellinen lähete.   |
| HIV-infektio  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kiireellinen lähete, jos hoitamaton HIV-infektio tai HIV-lääkityksen kesto &lt;6 kk.</li><li>• Ei-kiireellinen lähete, jos HIV-lääkityksen kesto &gt;6 kk.</li></ul> |
| TNF-salpaajahoito: esim. adalimumabi, etanersepti, golimumabi, infliksimabi, sertolitsumabipegoli ja näiden biosimilaarit   | Kiireellinen lähete.   |
| Muut immunosuppressiiviset lääkitykset: parhaillaan käytössä olevat solunsalpaajat, systeeminen steroidi >20 mg /vrk yli kuukauden ajan tai muut biologiset lääkkeet kuin TNF-salpaajat | Ei-kiireellinen lähete.  |