

Taulukko 4. LTBI-hoidon haittavaikutukset.

I Yleinen haittavaikutus

II Melko tavallinen haittavaikutus

III Harvinainen haittavaikutus

Haittavaikutus	Rifampisiini	Isoniatsidi	Rifapentiini
Virtsan- ja kyynelneste värjäytyvät punaisiksi. Piilolinssijä ei saa käyttää hoidon aikana.	I		I
Pahoinvointi, oksentelu.	II	II	II
Transaminaasien nousu ilman oireita.	II	I	II
Lääkehepatiitti.	II	I	II
Yliherkkyysoireet (kuume ja iho-oireet), urtikaria.	I	II	I
Neuropatia (puutuminen, pistely, tuntohäiriöt), jos ei B6-vitamiinia käytössä.		I	
Aknetyyppinen ihottuma.		III	
Kohtauksellinen kasvojen ja / tai päänahan punoitus ja kutina ohimenevästi 2–3 tuntia rifampisiini-lääkkeen ottamisesta. Voidaan estää antihistamiinilla.	III		
Tiettyjen elintarvikkeiden sisältämä tyramiini tai histamiini voi aiheuttaa kasvojen punoitus / päänsärkykohtauksen. Voi pahimmillaan johtaa verenpaineen laskuun ja pyörtymiseen. Voidaan estää seuraavien elintarvikkeiden välttämällä: kypsytetyt juustot, tonnikala, salami-tyyppiset makkarat, punaviini.		III	
Huimaus.	III	III	III
Depressio, psykoosi.		III	
Päänsärky, ataksia, keskittymishäiriöt, hallusinaatioita.	III		
Verenkuvamuutokset (leukopenia, trombopenia).	III	III	III
Nivelkivut.		III	III
Munuaisten akuutti vajaatoiminta (interstitiaalinfriitti, tubulusnekroosi, lupusnefriitti).	III	III	

Lisätietoa tuberkuloosilääkkeisiin liittyvistä haittavaikutuksista <http://tuberkuloosi.fi/tb-apuri/#/>. Klikkaa kohtaa tietoa lääkeyhdistelmistä ja valitse potilaan käyttämä lääkitys rastittamalla. Sen jälkeen valitse Tietoa lääkeyhdistelmistä- otsikon alta haittavaikutukset.