


# Viisi muistisääntöä hyvään käsihygieniaan

## Kun hoidat potilasta, jolla on perifeerinen laskimokatetri



### Muista myös nämä asiat, kun käsittelet perifeeristä laskimokatetria

- 1. Indikaatio:** varmista, että katetri on tarpeellinen. Poista tarpeeton katetri.
- 2. Asettaminen/ylläpito/poisto**
  - 2.1 Desinfioi pistokohta ennen katetrin asettamista vähintään 70 %:lla alkoholilla tai 2 %:lla klooriheksidiini-alkoholiliuoksella.
  - 2.2 Kun asetat tai poistat katetrin tai otat verinäytteen katetrin kautta, käytä tehdaspuhtaita käsineitä ja noudata aseptisia työskentelytapoja (sisältäen non-touch -tekniikan).
  - 2.3 Vaihda peittävät harsosidokset vähintään joka toinen vuorokausi ja läpinäkyvä suojakalvo 5–7 vuorokauden välein.
  - 2.4 Vaihda katetri tarvittaessa.
  - 2.5 Veri ja verituotteet: vaihda infuusioletkut viimeistään neljännen valmisteen jälkeen tai 12 tunnin kuluttua verensiirron aloituksesta. Rasvaliuokset: vaihda infuusioletkut infuusion päätyttyä tai viimeistään 24 tunnin kuluessa infuusion aloittamisesta. Muut määrävällein infusoitavat tuotteet kuten sytostaatit: toimi valmistajan ohjeiden mukaan. Jatkuviissa infuusiossa harkitse infuusioletkujen vaihtoa 96 tunnin välein.
- 3. Seuranta:** Kirjaa ajankohta, jolloin katetri on asetettu ja poistettu ja sidokset vaihdettu sekä päivittäinen pistokohdan ihon kunto.



World Health  
Organization

SAVE LIVES  
Clean Your Hands

Clean Care  
is Safer Care  
2005–2015