



Анализ эпидемической ситуации и качества оказания фтизиатрической помощи больным туберкулезом в Республике Карелия




Эпидемическая ситуация по туберкулезу в республике Карелия


Заболеваемость туберкулезом



Заболеваемость туберкулезом детей по РК (на 100,0 тыс. детского населения)



Смертность от туберкулеза



Ключевые мероприятия по снижению смертности

- 1 Внедрение программы по химиопрофилактике туберкулеза среди ВИЧ
- 2 Внедрение региональных межведомственных программ по привлечению к профилактическим осмотрам на туберкулез лиц из групп социального риска
- 3 Оснащение лабораторий молекулярно-генетическим оборудованием для ускоренной диагностики устойчивого туберкулеза
- 4 Внедрение новых клинических рекомендаций по диагностике и лечению туберкулеза
- 5 Расширение стационар замещающих технологий
- 6 Организация выездных специализированных бригад федеральных НИИ для диагностики и лечения туберкулеза
- 7 Улучшение лекарственного менеджмента

Оценка эффективности мероприятий по снижению смертности (продолжение)

① Внедрение программы по химиопрофилактике туберкулеза среди ВИЧ

Сочетанная инфекция ТБ+ВИЧ

❑ 2013 год – 8 впервые выявленных больных, 2014 год – 12 человек, 2015 — 12 человек, 2016 — 16 человек.

❑ Заболеваемость ТБ+ВИЧ-1,8 на 100, 0 тыс. чел.

Удельный вес ТБ+ВИЧ среди контингентов – 5,8% (4,9 на 100,0 тыс. населения)


Оценка эффективности мероприятий по снижению смертности (продолжение)

3 Оснащение лабораторий молекулярно-генетическим оборудованием для ускоренной диагностики устойчивого туберкулеза



План — МГМ В/В ТБ- 95%


Факт — 85,7%



Оценка эффективности мероприятий по снижению смертности (продолжение)

4 Внедрение новых клинических рекомендаций по диагностике и лечению туберкулеза


Результаты лечения всех МЛУ пациентов
в когорте 2012-2014 гг.



Оценка эффективности мероприятий по снижению смертности (продолжение)

4 Внедрение новых клинических рекомендаций по диагностике и лечению туберкулеза

Результаты курса химиотерапии у впервые выявленных больных МБТ (+) м/скопии, зарегистрированных для лечения в 2015 (Пр.50)



Оценка эффективности мероприятий по снижению смертности (продолжение)

4 Внедрение новых клинических рекомендаций по диагностике и лечению туберкулеза

Показатели, характеризующие эффективность лечения

- ☐ Абациллирование всеми методами – в/в больных 56,9%, у рецидивов -45% (по ф.33)
- ☐ Закрытие полостей распада – у в/в больных 53,4%, у рецидивов = 50%
- ☐ Клиническое излечение ТОД = 30,8%

Оценка эффективности мероприятий по снижению смертности (продолжение)

5 Расширение стационар замещающих технологий

1. Отделение стационар замещающих технологий (3 формы лечения)
2. Клинический психолог, юрист, социальный работник в штате РПТД



Благодарю за внимание!