



АНАЛИЗ
ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

за период 2012-2016гг.


Заболеваемость туберкулезом в Мурманской области в сравнении с РФ, СЗФО 2012 – 2016 гг. (на 100 тыс. населения).




Заболееваемость туберкулезом постоянного населения в Мурманской области в сравнении с РФ, СЗФО 2012 – 2016 гг. (на 100 тыс. населения)



Смертность от туберкулеза в Мурманской области в сравнении с РФ, СЗФО 2012 – 2016 гг.



Распространенность туберкулеза в Мурманской области в сравнении с РФ, СЗФО 2012 – 2016 гг. (на 100 тыс. населения)



Множественная лекарственная устойчивость среди бациллярных форм туберкулеза в Мурманской области (в %)

Год	Первичная лекарственная устойчивость (% к охвач.ТЛЧ)	Состоящие на учете с МЛУ туберкулёзом (% среди ТОД с бак-ем)
2011	33	47.3
2012	22	54.5
2013	27.8	51.4
2014	40.9	59.2
2015	31.6	56.1
2016	38.8	53.8

- В Мурманской области имеется высокий уровень множественной лекарственной устойчивости, в т. ч. отмечается рост первичной МЛУ: в 2016 – 38,8% (в 2015 г – 31,6, в 2014 г – 40,9%, в 2013г – 27,8%, в 2012г. - 22%).

Эффективность лечения.

- Вновь выявленные больные в 2016 году госпитализированы в 61,8 % случаях (в 2015 – 41,1%, в 2014г – 59,2%, в 2013 году – 62,6%, в 2012г - 64,6%), из них пациенты с бактериовыделением, определяемым методом простой микроскопией, госпитализируются в 100% (в 2015 г -100%, в 2014г-100%, в 2013 г-100%, в 2012г. - 100%).
- Показатель клинического излечения больных туберкулезом составил 29,1 % (в 2015 году – 27,5%, в 2014г- 26,4%, в 2013 году - 27,1%).
- Показатель абациллирования туберкулеза органов дыхания в 2016 году составил 41,8%, что на 7% ниже уровня 2015г. (в 2015 году – 48,8%, в 2014г. - 48,2%, в 2013г. - 40,4%, в 2012 году – 34,6%).
- Закрытие полостей распада достигнуто в 51,2% (в 2014г. – 51,8%, в 2013г. – 54,4%,).

Структура противотуберкулёзной службы.

ГОБУЗ МОПТД имеет в своем оснащении:

1. Круглосуточный стационар:

Первое отделение (чувствительные формы туберкулеза)

Второе отделение (с резистентными формами).

Размещение пациентов осуществляется с соблюдением инфекционного контроля.

2. Амбулаторно-поликлиническое отделение:

-6 участков по обслуживанию взрослого населения

-стационар на дому

-4 детских кабинета фтизиатра

3. Областная противотуберкулезная служба включается в себя 18 противотуберкулезных кабинетов.

Благодарю за внимание

